

表1 SCCAI

排便回数（日中）	スコア
1～3回	0
4～6回	1
7～9回	2
>9回	3

排便回数（夜間）	スコア
1～3回	1
4～6回	2

便意切迫	スコア
急	1
即刻	2
失禁	3

血便	スコア
わずか	1
時折明らか	2
いつも明らか	3

一般状態	スコア
かなり良好	0
わずかに標準以下	1
不良	2
かなり不良	3
極めて不良	4

腸管外合併症	各1点
関節炎	
壊疽性膿皮症	
結節性紅斑	
ぶどう膜炎	

表2 Mayo Score

排便回数	スコア
正常回数	0
正常回数より1～2回/日多い	1
正常回数より3～4回/日多い	2
正常回数より5回/日以上多い	3

血便	スコア
血便なし	0
排便時の半数以下でわずかに血液が付着（縞状）する	1
ほとんどの排便時に明らかな血液の混入が見られる	2
大部分が血液である	3

内視鏡評価（Mayo endoscopic subscore）	スコア
正常または非活動性所見	0
軽症 （発赤、血管透見像の減少、軽度脆弱）	1
中等度 （著明に発赤、血管透見像の消失、脆弱、びらん）	2
重症 （自然出血、潰瘍）	3

医師による全般的評価（Physician's global assessment）	スコア
正常	0
軽症	1
中等度	2
重症	3

表3 HBI

一般状態	スコア	腹部	スコア	1日あたりの水様便回数	（回=点）
良好	0	なし	0	<input type="text"/>	
やや不良	1	軽度	1		
不良	2	中等度	2		
かなり不良	3	高度	3		
極めて不良	4				

腹部腫瘍	スコア	合併症	各1点
なし	0	関節痛	
疑いあり	1	ぶどう膜炎	
あり	2	結節性紅斑	
あり、圧痛を伴う	3	アフタ性潰瘍	
		壊疽性膿皮症	
		裂肛	
		新たな瘻孔	
		膿瘍	