

図 4

ASUC 治療フローチャート

入院を要する ASUC

- ・中毒性巨大結腸症や穿孔の除外 (腹部レントゲン, CT 検査)
- ・*C. difficile* や CMV 感染の除外
- ・内視鏡検査 (直腸や S 状結腸までの観察, CMV 腸炎の鑑別, 生検検体採取)
- ・血栓予防を考慮 (低分子ヘパリンや弾性ストッキング)

ASUC (Acute severe UC) の定義

- ・血便回数 1 日 6 回以上, かつ下記の最低 1 つがあてはまる状態
- ・頻脈 > 90 回 / 分
- ・発熱 > 37.8°C
- ・Hb < 10.5 g/dl
- ・赤沈 > 30 mm/hr

- ・*C. difficile*, CMV が陽性的場合, それに対する治療

- ・ASUC の治療を開始
- ・**IV ステロイド** (プレドニゾン 1.0 - 1.5 mg/kg) を 3 - 5 日間投与
- ・臨床症状と CRP を日々評価

臨床的な反応なし

臨床的な反応あり

- ・インフリキシマブまたはカルシニューリン阻害薬の開始
- ・外科へのコンサルト (より早期の連携が好ましい)

- ・プレドニゾンの内服へ切り替え
- ・外来治療へ移行